



**TODO DIA É DIA DE VACINA.**

VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DOSES		INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		*DOSAGEM	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	****TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTO FRASCO	ALGUNS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO	MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
BCG	Tuberculose	Bactéria viva atenuada	1 dose	Depende da Indicação (1)	Ao nascer	4 anos, 11 meses e 29 dias (1)	-	-	0,1 ml	Intradérmica (ID)	Inserção Inferior do músculo deltoide direito	13x3,8	6 horas	Reações locais e/ou regionais; Úlcera > 1 cm, abscessos, linfadenopatias.
Hepatite B	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antigênio de superfície	4 doses (2)	-	Ao nascer	49 anos, 11 meses e 29 dias (2)	2 meses	60 dias	0,5 ml até 19 anos - acima 1 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa eq. ou deltoide	20x5,5 25x6	15 dias	Reações locais. Febre, cefaléia, anafilaxia (raramente).
Poliomielite inativada (VIP)	Poliomielite	Vírus inativado tipos I, II, e III	2 doses	-	2 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa eq.	20x5,5 25x6	7 dias	Reações locais. Febre.
Poliomielite oral (VOP)	Poliomielite	Vírus vivo atenuado tipos I, II, e III	1 doses (3)	1 Ref. 1 ano após a D1 2º Ref. 4 anos de idade	6 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	1 ano após a 3ª dose	30 dias	2 gotas	Oral (VO)	-	-	5 dias	Eventos sistêmicos leves. Reações de hipersensibilidade. (raras)
Rotavírus humano oral (VORH)	Diarréia por rotavírus	Vírus vivo atenuado	2 doses (4)	-	1ª dose: 1 mes e 15 dias 2ª dose: 3 meses e 15 dias	1ª dose: 3 meses e 15 dias 2ª dose: 7 meses e 29 dias	60 dias	** 30 dias	1.0 ml	Oral (VO)	-	-	Monodose	Dor abdominal, náuseas, vômitos, invaginação intestinal.
DTP+Hib+HB (Penta)	Difteria, tétano, coqueluche / meningite por Haemophilus b/ hepatite B	Bactéria morta e produto de toxinas/polissacarídeo do Hib. conjugado a uma proteína antigênio de superfície de HB	3 doses	1ª ref.: 1 ano após a 3ª dose, com a vacina DTP	2 meses	6 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa direita	20x5,5 25x6	5 dias	Reações locais. Febre, vômitos, irritabilidade, choro prolongado, EHH, convulsão e anafilaxia. (raramente)
Pneumocócica 10 valente	Pneumonias, meningites, otites, sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina	Polissacarídeo capsular de 10 sorotipos pneumococos	3 doses	12 à 15 meses	2 meses	1ano, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa esquerdo	20x5,5 25x6	Monodose	Reações locais Febre, cefaléia, mialgias, artralgia, astenia, EHH, choro prolongado.
Meningocócica C conjugada	Meningite tipo C	Oligossacarídeo conjugado com a proteína CRM <sup>(197)</sup>	2 doses	12 à 15 meses	3 meses	1ano, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa direito	20x5,5 25x6	Monodose	Reações locais. Febre, sonolência, hipotividades, cefaléia, exantema, EHH.
Febre amarela	Febre amarela (5)	Vírus vivo atenuado	1 dose	A cada 10 anos	9 meses	-	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Face ant. lateral ext. antebraço ou deltoide	13x4,5	4 horas	Reações locais. Febre, mialgia, cefaléia, artralgia, reações de hipersensibilidades.
Tríplice viral (SCR) (6)	Sarampo Caxumba Rubéola	Vírus vivo atenuado	1 dose	15 meses com Tetra viral	12 meses (6)	-	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Face ant. lateral ext. antebraço ou deltoide	13x4,5	8 horas	Reações locais. Febre, exantema, cefaléia, parotidite, artrite, púrpura, trombocitopenia
Tetra viral (SCRV) (6)	Sarampo Caxumba Rubéola + Varicela	Vírus vivo atenuado	1 dose	-	15 meses	1ano, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Face ant. lateral ext. antebraço ou deltoide	13x4,5	8 horas	Reações locais. Febre, exantema, cefaléia, parotidite, artrite, púrpura, trombocitopenia.
Tríplice bacteriana (DTP) (7)	Difteria Tétano Coqueluche	Bactéria Morta e Produto de Bactéria (toxina)	Considerar doses anteriores (3 doses)	1º ref.: 18 meses 2º ref, 4 anos (7)	15 meses	6 anos, 11 meses e 29 dias	1º ref. 1ano após 3ª d EB	1º ref. 6 m após 3ª d EB, 2º ref. 6 m após 1º ref	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa direita	25x6	15 dias	Reações locais. Febre, vômitos, choro irritabilidade, prolongado, EHH, convulsão e anafilaxia (raramente)
Dupla bacteriana Uso adulto (dT)	Difteria e Tétano	Produto de Bactéria (toxina)	Considerar doses anteriores (3 doses)	A cada 10 anos Gestantes/ferimentos graves a cada 5 anos	7 anos	-	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Deltoide, vasto lat.da coxa	25x6	15 dias	Reações locais. Febre e anafilaxia. (raramente)

## ESQUEMA DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE

VACINAS	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DOSES		INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		*DOSAGEM	VIAS DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTO FRASCO	ALGUNS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO	MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
<b>Hepatite B (2)</b>	Hepatite B	Partícula da Cápsula do Vírus Antígeno de Superfície	3 doses (considerar doses anteriores)	-	Ao nascer	49 anos, 11 meses e 29 dias (2)	2ª dose 1 mês após 1ª dose; 3ª dose 5 meses após 2ª dose	2ª dose 1 mês após 1ª, 3ª dose 2 m após 2ª dose	0,5 ml até 19 anos - acima 1 ml	Intramuscular (IM)	Músculo Deltóide	25x6	15 dias	Reações locais: Cefaléia, anafilaxia (raramente)
<b>Dupla bacteriana Uso adulto (dT)</b>	Difteria e Tétano	Produto de Bactéria (toxina)	3 doses (considerar doses anteriores)	A cada 10 anos Gestantes/ferimentos graves a cada 5 anos	7 anos	-	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo Deltóide	25x6	15 dias	Reações locais. Febre, e anafilaxia (raramente)
<b>Febre amarela</b>	Febre Amarela (5)	Vírus Vivo Atenuado	1 dose	A cada 10 anos	*** 9 meses	-	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Deltóide	13x4,5	4 horas	Reações locais Febre, Mialgia, Cefaléia, Reações de hipersensibilidades
<b>Tríplice viral (SCR) (6)</b>	Sarampo Caxumba Rubéola	Vírus Vivo Atenuado	2 doses (considerar doses anteriores)	-	12 meses	49 anos	90 dias	30 dias	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Deltóide	13x4,5	8 horas	Reações locais Febre, Exantema/ Cefaléia, Parotidite, Artrite, Púrpura, Trombocitopenia

## ESQUEMA DE VACINAÇÃO DO ADULTO E IDOSO

VACINAS	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DOSES		INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM	VIAS DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTO FRASCO	EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO	MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
<b>Hepatite B (2)</b>	Hepatite B	Partícula da Cápsula do Vírus Antígeno de Superfície	3 doses	-	Ao nascer	49 anos, 11 meses e 29 dias (2)	2ª dose 1 mês da 1ª dose; 3ª dose 5 m 1ª dose	2ª dose 1 mês da 1ª dose; 3ª dose 2 m 1ª dose	0,5 ml até 19 anos - acima 1 ml	Intramuscular (IM)	Músculo Deltóide	25x6 25x7	15 dias	Reações locais: Cefaléia, anafilaxia (raramente)
<b>Dupla bacteriana Uso adulto (dT)</b>	Difteria e Tétano	Produto de Bactéria (toxina)	3 doses	A cada 10 anos Gestantes/ferimentos graves a cada 5 anos	7 anos	-	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo Deltóide	25x6 25x7	15 dias	Reações locais. Febre, EHH, e anafilaxia (raramente)
<b>Febre amarela</b>	Febre Amarela (5)	Vírus Vivo Atenuado	1 dose	A cada 10 anos	9 meses	-	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Deltóide	13x4,5	4 horas	Reações locais Febre, Mialgia, Cefaléia, Reações de hipersensibilidades
<b>Tríplice viral (SCR) (6)</b>	Sarampo Caxumba Rubéola	Vírus Vivo Atenuado	2 doses (considerar doses anteriores)	-	12 meses	49 anos	90 dias	30 dias	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Deltóide	13x4,5	8 horas	Reações locais Febre, Exantema/ Cefaléia, Parotidite, Artrite, Púrpura, Trombocitopenia
<b>* Influenza sazonal (8)</b>	Influenza (gripe)	Vírus fracionado, Inativado	1 dose	Dose anual	60 anos	-	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	7 dias	Reações locais Febre, Mal estar, Mialgia.
<b>* Pneumocócica 23-valente (Pno-23) (9)</b>	meningites bac pneumoniae, sinusite, etc.	Polissacarídeo capsular de 23 sorotipos pneumococos	1 dose	A cada 5 anos (9)	60 anos	-	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Músculo deltoide	25x6 25x7	Monodose	Reações locais Febre, mialgias, artralgia, cefaléia, astenia.

**\* VACINAS APLICADAS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO – CONSULTE: [www.saude.pr.gov.br](http://www.saude.pr.gov.br) / vacinas ou Programas: Programa Estadual de Imunização.**

### OBSERVAÇÃO:

- (1) Esta vacina pode ser aplicada em outras faixas etárias (comunicantes de MH e na ausência de cicatriz até 4 anos de idade).
- (2) Em crianças iniciar esquema com VHB monovalente, e prosseguir esquema com DTP+HIB+HB. Esta vacina é aplicada também em profissionais de saúde e grupos de risco, conforme indicações.
- (3) Iniciar a vacina VOP aos 6 meses de idade, somente após aplicação da 1ª e 2ª dose com a vacina VIP aos 2 e 4 meses de idade.
- (4) Se regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose, considerar dose válida.
- (5) Esta vacina não pode ser utilizada em gestantes e em mulheres que estejam amamentando.
- (6) Indicada vacinação de mulheres em idade fértil, e em bloqueios de casos de suspeita de sarampo e rubéola a partir dos 6 meses. Após a aplicação da vacina, recomenda-se não engravidar por um período de 30 dias. Não pode ser aplicada simultaneamente com a vacina da Febre Amarela. Respeitar o intervalo mínimo de 30 dias.
- (7) Utilizada para 1ª e 2ª dose de reforço das vacinas tetravalente/penta.
- (8) Oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação para Idosos com 60 anos ou mais.
- (9) Administrar 1 (uma) dose durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, nos indivíduos de 60 anos e mais que vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso. Dose reforço após 5 (cinco) anos da dose inicial, **somente com indicação médica.**

Elaborado por: João Luís G. Crivellaro; Lucia Helena L. Bisetto; Fernanda Crosewski; Tânia R. Flores; Beatriz Thiel. Artes: Anita Entres (SESA-PR)

- A aplicação de uma ou mais vacinas, no mesmo dia, não oferece nenhum risco à pessoa vacinada, (**exceto** a vacina **SCR/SCRV**, simultaneamente com a vacina **Febre amarela**, que deverá ser respeitado o intervalo mínimo de 30 dias.
- Se o esquema da vacinação for interrompido, não é necessário reiniciá-lo, basta completar as doses que faltam. **DESDE QUE APRESENTE REGISTRO DE VACINAÇÃO.**
- As outras vacinas de vírus vivo atenuado podem ser administradas no mesmo dia ou respeitar o intervalo de 30 dias. Caso sejam vacinas de vias diferentes, pode ser administradas com qualquer intervalo entre as doses.

\* Verificar indicação do PNI  
 \*\* Considerar idade mínima para administrar 2ª dose.  
 \*\*\* Em situações de risco, vacinar a partir dos 6 meses de idade.  
 \*\*\*\* Poderá variar de acordo com o laboratório produtor.